



77100579

מירי צ'אני



מעיני הישועה. מקצוענים עם נאמף.

הצרות מולדת של שוער קיבה Pyloric Stenosis

מרכז רפואי
מעיני הישועה
מקצוענים עם נאמף.



לתיאום תורים 24 שעות ביממה: 03-5771188
לבירורים בנושא מתן התחייבות מקופ"ח, ניתן לפנות ליחידת הגביה: 03-5771171

לפרטים נוספים 03-577-1111 | רחוב הרב פוברסקי 17, בני ברק | www.mymc.co.il

הצרות מולדת של שוער קיבה Pyloric Stenosis

שוער הקיבה הוא שריר טבעתי הנמצא בקטע הסופי של הקיבה, לפני המעבר אל התריסריון. כאשר דפנות השוער עבות מהרגיל מסיבה לא ברורה, נוצרת חסימה במעבר תוכן קיבה אל התריסריון.

התופעה שכיחה בעיקר אצל בנים בכורים, ומסתמנת לרוב בגילאים 3-6 שבועות.

תסמינים:

הקאות מרובות לאחר כל ארוחה או מספר ארוחות. הקאה קשתית. עיכוב של עליה במשקל או אף ירידה, אי שקט או התייבשות.

טיפול:

הטיפול היחיד לבעיה זו הוא ניתוח. יש לאזן את ילדכם מבחינת נוזלים ומלחים לפני הניתוח.

הניתוח:

לפני הניתוח הפסקת כלכלה לפי הוראות הרופא המטפל. בזמן הפסקת כלכלה, ילדכם יקבל עירוי נוזלים דרך הוריד. הניתוח מבוצע בהרדמה כללית. דרך חתך קטן בבטן או בגישה טבורית מבצעים חיתוך בשריר המעובה של שוער הקיבה ללא פגיעה ברירית.

לאחר הניתוח:

כשש שעות לאחר הניתוח מוציאים את הזונדה מהקיבה. כעבור שמונה שעות מהניתוח מחדשים כלכלה רגילה בהדרגה. לרוב, מהלך ההחלמה לאחר הניתוח קל יחסית, ודורש מעט תרופות לשיכוך כאבים.

טיפול בבית:

בתקופה שלאחר ניתוח רוב הילדים סובלים מפליטות לאחר ארוחות, אולם, תופעה זו חולפת במשך הזמן. לאחר כל ארוחה יש להחזיק את התינוק על כתף ולאפשר לו הוצאת אויר מקיבתו. חשוב לשמור על סדר בארוחות או הנקה.

בברכת החלמה מהירה
צוות המחלקה הכירורגית ילדים
מרכז רפואי מעיני הישועה

